呼吸器の機能障害の状況及び所見

概ね３ケ月以内の検査データを記載して下さい。　　（該当するものを○でかこむこと）

1　身体計測

身長　　cm　　体重　　kg

2　活動能力の程度

ア　激しい運動をした時だけ息切れがある。

イ　平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな上り坂を歩くときに息切れがある。

ウ　息切れがあるので、同年代の人より平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある。

エ　平坦な道を約 100m、あるいは数分歩くと息切れのため立ち止まる。

オ　息切れがひどく家から出られない、あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある。

3　胸部エックス線所見（平成　　年　　月　　日）

ア　胸膜癒着　　（無・軽度・中等度・高度）

イ　気 腫 化　　（無・軽度・中等度・高度）

ウ　線 維 化　　（無・軽度・中等度・高度）

エ　不透明肺　　（無・軽度・中等度・高度）

オ　胸郭変形　　（無・軽度・中等度・高度）

カ　心・縦隔の変形　（無・軽度・中等度・高度）



4　換気機能　（平成　　年　　月　　日）

ア　予測肺活量　　＿＿・＿＿＿　L　（実測肺活量　　＿＿・＿＿＿　L）

イ　１秒量　　＿＿・＿＿＿　L　（実測努力肺活量　　＿＿・＿＿＿　L）

ウ　予測肺活量１秒率　＿＿＿・＿＿　％　（＝ $\frac{イ}{ア}$ ×100）

（アについては、下記の予測式を使用して算出すること。）

肺活量予測式（L）

男性 0.045×身長(cm)－0.023×年齢(歳)－2.258

女性 0.032×身長(cm)－0.018×年齢(歳)－1.178

（予測式の適応年齢は男性 18-91 歳、女性 18-95 歳であり、適応年齢範囲外の症例には使用しないこと。）

5　動脈血ガス（平成　　年　　月　　日）

ア　O_2　分圧：　＿＿＿＿＿＿・＿＿＿　Torr

イ　CO_2 分圧：　＿＿＿＿＿＿・＿＿＿　Torr

ウ　PH　：　＿＿・＿＿＿

エ　採血より分析までに時間を要した場合　＿＿＿　時間　＿＿＿　分

オ　耳朶（だ）血を用いた場合：［　　］

※酸素吸入下で計測した場合：採血時の酸素量　＿＿・＿＿　リットル／分

酸素を外せない理由

6　その他の臨床所見　　※指数と O_2 分圧に不均衡がある場合等、障害等級を判断した理由を、判断の根拠となった他の検査データ等と併せて記載して下さい。