

すべての新型コロナウイルス感染症の 高齢者に抗ウイルス薬を！

新型コロナウイルス感染症に感染した患者に抗ウイルス薬を投与した場合、重症化を抑制する効果が見られることが分かっています。対象となる方へ、診断時に治療をご検討いただきますようお願いいたします。

65歳以上 又は **透析中** のすべての陽性患者に
治療をご検討ください



経口ウイルス薬

ラゲブリオ

(モルヌピラビル)

1日2回 5日間投与

<特徴>

- カプセルが大きい
- 1回4カプセル内服
- 投与前採血は必須ではない
- 脱カプセル化して懸濁、胃管投与可
- 重症化予防効果はパキロビッドよりも低い使いやすい



経口ウイルス薬

パキロビッドパック

(ニルマトレルビル/リトナビル)

1日2回 5日間投与

<特徴>

- 併用禁忌・注意の薬剤が多い
- 中等度以上の腎障害患者が減量が必要(腎機能の確認が必要)
- 効果は高いが上記の理由で使用しにくい面がある
- かかりつけで情報が十分あれば使用できる。



抗ウイルス薬

レムデシビル

(バクルリー)

1日1回
軽症:3日間 肺炎有:5~10日間

<特徴>

- 点滴が可能な状況であれば、入院・施設とも選択可
- 重症化予防効果は高い

65歳以上をはじめ、重症化リスクに合致する事項があれば、積極的に治療を検討してください。